

# Medicamentos huérfanos oncológicos aprobados por la CE y pendientes de decisión de comercialización en España



MEDICAMENTO	INDICACIÓN (breve descripción)
<b>Qinlock</b> (Ripretinib)	Tratamiento de pacientes adultos con tumor del estroma gastrointestinal gastro intestinal avanzado (GIST).
<b>Abecma</b> (Idecabtagene vicleucel)	Tratamiento de pacientes adultos con mieloma múltiple que hayan recibido al menos tres terapias previas.
<b>Inrebic</b> (Fedratinib dihidrocloruro monohidrato)	Tratamiento de la esplenomegalia o los síntomas relacionados con la enfermedad en pacientes adultos con mielofibrosis primaria, mielofibrosis posterior a policitemia vera o mielofibrosis posterior a la trombocitopenia esencial.
<b>Elzonris</b> (Tagraxofusprato)	Tratamiento (en monoterapia) de pacientes adultos con neoplasia de células dendríticas plasmocitoides blásticas.
<b>Tecartus</b> (Células T de sangre periférica autólogas CD4 y CD8 seleccionadas y CD3 y CD28 activadas transducidas)	Tratamiento de pacientes adultos con linfoma de células del manto en recaída o refractario después de dos o más líneas de terapia sistémica.
<b>Qarziba</b> (Dinutuximab beta)	Tratamiento del neuroblastoma de alto riesgo en pacientes a partir de 12 meses de edad que hayan recibido previamente quimioterapia de inducción y hayan logrado al menos una respuesta parcial, seguida de terapia mieloablativa y trasplante de células madre.
<b>Minjuvi</b> (Tafasitamab)	Tratamiento de pacientes adultos con linfoma difuso de células B grandes en recaída o refractario que no son elegibles para un trasplante autólogo de células madre (en combinación con lenalidomida).
<b>Pemazyre</b> (Pemigatinib)	Tratamiento de adultos con colangiocarcinoma localmente avanzado o metastásico con una fusión o reordenamiento del receptor del factor de crecimiento de fibroblastos 2 (FGFR2).
<b>Blenrep</b> (Belantamab mafodotin)	Tratamiento (en monoterapia) del mieloma múltiple en pacientes adultos, que hayan recibido al menos cuatro terapias previas.
<b>Daurismo</b> (Glasdegib maleato)	Tratamiento (en combinación con citarabina) de la leucemia mieloide aguda de novo o secundaria recién diagnosticada en pacientes adultos que no son candidatos a la quimioterapia de inducción estándar.
<b>Ayvakyt</b> (Avapritinib)	Tratamiento (en monoterapia) de pacientes adultos con tumores del estroma gastrointestinal resecables o metastásicos que albergan la mutación D842V del receptor del factor de crecimiento derivado de las plaquetas.
<b>Xaluprine</b> (mercaptopurine)	Tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda en adultos, adolescentes y niños.